

**Уважаемый пациент!** Если у Вас есть желание привиться от COVID-19, то нужно об этом сообщить лечащему врачу. В нашем учреждении есть возможность организовать выезд прививочной бригады СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» (выезд прививочной бригады возможен при наличии 15 чел. желающих).

Вакцинацию против COVID-19 проводят вакциной «Гам-КОВИД- Вак» (далее — вакциной) гражданам, не имеющим медицинских противопоказаний, с добровольного согласия граждан в медицинских организациях.

Показания к применению: Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у взрослых от 18 лет и старше.

**Противопоказаниями к применению являются:**

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний — вакцинацию проводят через 2- 4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры;
- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).

**Противопоказания для введения компонента II:**

- тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температур выше 40°C и т.д.) на введение компонента I вакцины.

**ПРИМЕНЯЕТСЯ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ ПРИ:** хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях (выраженные нарушения функции щитовидной железы и сахарный диабет в стадии декомпенсации), тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях ЦНС, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах, перикардитах.

**Вследствие недостатка информации** вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов:

- с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными новообразованиями.

**Ситуации, не включенные в инструкцию к вакцине**, которые необходимо учитывать, как временные противопоказания: контакт с больным или подозрением на заболевание COVID-19 менее чем за 14 дней до прививки; предшествующая плановая вакцинация (против дифтерии, кори - вакцинация от коронавирусной инфекции проводится через 1 мес).

К вакцинированию допускаются лица, заполнившие анкету пациента и не имеющие противопоказаний к вакцинированию. После вакцинации пациент должен находиться под наблюдением медицинского персонала в течение 30 минут!

**Обязательно при себе иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС, сертификат о прививках (при наличии)!**